

殺菌剤

その他の病害

商品名	主成分・濃度 (%)	規格	価格(円)	重量/ml	毒性		登録芝種					摘収病害 (標準・水濁/ml)	
					人畜	魚毒	日本芝	ペントグラス	ライグラス	パルメータグラス	その他		
アグリマイシン100	オキシテトラサイクリン	1.5	500g×20	61,600	1g	毒			● (生産密地)				かさ枯病 500倍 0.5L
イカルガ35SC	チフルザミド	35	500ml×10	104,000	0.15~0.33ml	毒		●	●			フルー	雲霧小粒菌核病 (ブルーグラス、ペントグラス) 1000~2000倍 0.3L
ウィルド顆粒水和剤	トルクロホスメチル	50	500g×10	70,000	0.25~0.5g	毒		●	●				イエローパッチ (ペントグラス) 1000倍 0.5L
エイゲン水和剤	ピリフチカルブ	47	500g×20	115,500	1.0~1.5	毒	A類相当	●	●				雲霧小粒菌核病 (ペントグラス) 200倍 0.3L
オキシンドー水和剤90	有機銅水和剤	80	1kg×20	99,700	2~8g	毒	C類相当		●				雲霧病 (芝) 250~500倍 1~2L 40~80倍 0.2L かさ枯病 (ペントグラス) 200倍 0.5L
カシマン液剤	イミノクタン酢酸塩	5	1L×10	23,500	0.25~0.3ml	毒	A類相当	●	●		●		紅色雲霧病 (ペントグラス) 125倍 0.25L 300倍 1L
キノンドー水和剤80	有機銅	80	1kg×10	51,500	1.25~5g	毒							雲霧病 (芝) 200~400倍 0.5~1L 80~100倍 0.2~0.25L
キノンドー粒剤	有機銅	10	20kg×1	20,750	20g	毒							雲霧病 (芝) 20g
グラステン水和剤	イソプロチオラン	20	1kg×10	54,000	0.5~10g	毒	B類相当	●	●	●	●	フルー	紅色雲霧病 雲霧小粒菌核病 (ブルー、ペント) 300~500倍 1L さび病 (日本芝、ライグラス) 500倍 1L
グラステン粒剤	イソプロチオラン	4	10kg×2	20,500	15~60g	毒	B類相当	●	●			フルー	雲霧小粒菌核病、 紅色雲霧病 (ペント、ブルー) 40~60g
グランサー水和剤	トルクロホスメチル	75	1kg×10	81,000	0.3~2g	毒		●	●				象の足跡 (日本芝) 1000倍 0.1L 雲霧小粒菌核病 (ペントグラス) 500~750倍 0.5~1L イエローパッチ (ペントグラス) 1000倍 1L
クリアパッチDF	トリフミゾール	50	500g×10	102,800	0.2~0.5g	毒	B類相当	●	●				さび病 (日本芝) 1000倍 0.2L
グリーンドクターII	水酸化第二銅	46.1	1kg×10	65,000	1g	毒			●				かさ枯病 500倍 0.5L/10a 斑状小粒菌核病 1000倍 200L~700L/10a
クルセイダーフロアブル	テフコゾール	40	500ml×10	78,000	0.2~0.25ml	毒		●				フルー	ソイシアジクライン さび病 象の足跡 (日本芝) 1000倍 0.25L
サブロー乳剤	トリホリン	18	500ml×20	111,000	1~10ml	毒		●	●				さび病 (芝) 1000倍 1~2L
逆襲人フロアブル	メトコナゾール	20	500ml×12	78,000	0.25~0.33ml	毒		●	●	●		フルー	紅色雲霧病 雲霧小粒菌核病 (ペントグラス、ライグラス) 1500倍 0.5L 600倍 0.2L 紅色雲霧病 (ブルー) 1500倍 0.5L 600倍 0.2L 日本芝 象の足跡 ソイシアジクライン 750~1000倍 0.25L
シバンEXフロアブル	アゾキシストロピン	9.2	1L×10	71,000	0.4~0.6ml	非該当		●					立枯病 333~500倍 0.2L 象の足跡 333~500倍 0.2L ネクロティック リングスポット病 250~500倍 0.2L
シャルマット水和剤	ベノミル	15	1kg×10	93,250	1~8.3g	毒	B類相当	●	●	●		フルー	さび病 (ライグラス、日本芝) 600倍 1~2L 象の足跡 (日本芝) 1000倍 1~2L 紅色雲霧病 雲霧小粒菌核病 (ペントグラス、ブルーグラス) 100~150倍 0.2L 600~1000倍 1~2L イエローパッチ (ペントグラス) 600倍 1~2L
ゼンチネル顆粒水和剤	ジフロコナゾール	40	200g×10	89,000	0.1~0.13g	非該当		●					象の足跡 さび病 立枯病 2500倍 0.25L ネクロティック リングスポット病 2000~2500倍 0.25L
ターフトップDF	クレソキシムメチル	40	500g×10	68,000	0.2~1g	毒	B類相当	●	●				象の足跡 (日本芝) 1000倍 0.5L さび病 (日本芝) 1000倍 0.2~0.25L 雲霧小粒菌核病 イエローパッチ (ペントグラス) 1000倍 0.5L
ダイブフロアブル	アゾキシストロピン	18.2	250ml×10	72,000	0.3~0.5ml	非該当							雲霧小粒菌核病 1000倍 0.3L
	ジフェノコナゾール	11.3											紅色雲霧病 1000倍 0.3L
ダコグリーン顆粒水和剤	チウラム	30	1kg×10	32,000	2g	毒		●	●				葉腐 (ペントグラス) 重量 2g 水濁 0.5L
ダコニールターフ	TPN	53	1L×12	64,200	1~1.6ml	毒		●	●				斑状小粒

商品名	主成分・含量 (%)		規格	価格(円)	質量/m <sup>2</sup>	毒性		登録定額					用 意 病 害 (標準・水量/m <sup>2</sup> )		
						人畜	魚毒	日本芝	ベントグラス	ライグラス	パミュダグラス	その他	その他	その他	
ドウグリン水和剤	有機銅	80	1kg×10	56800	1.7~6.3g	毒		●	●						紅色雲霧病 (ベントグラス) 80~100倍 0.2~0.25L 雲霧小粒菌核病 (ベントグラス) 80~100倍 0.2~0.25L 400倍 0.1L かき枯病 (ベントグラス) 200倍 0.5L 葉腐 (ベントグラス) 80~120倍 0.2~0.3L
トップグラスDF	チオファネートメチル	70	1kg×10	56,130	0.5~1g	毒	A類相当	●	●						イエローパッチ (ベントグラス) 1000倍 0.5L 葉の足跡 (日本芝) 1000倍 0.5L
トップティ水和剤	チオファネートメチル	45	1kg×5	62,600	0.5~2g	毒		●	●						さび病 (日本芝) 500~1000倍 0.5~1L ネットウィックリングスポット病 (高草型) 150倍 0.25L 400倍 0.5L
トップバスター-観音水和剤	チオファネートメチル	35	1kg×10	60,660	0.5~1g	毒	A類相当	●	●						雲霧小粒菌核病、 紅色雲霧病 (ベントグラス) 500倍 0.5L
トライアンプ水和剤	フルトラニル	40	800g×10	49,000	0.4~0.8g	毒	A類相当	●	●						雲霧小粒菌核病 (ベントグラス) 625倍 0.5L
パンパッチ水和剤	プロピコナゾール	4	1kg×5	46,875	1~2g	毒		●	●						葉の足跡 (日本芝) 1000倍 1L 雲霧小粒菌核病 (ベントグラス) 500倍 1L
パッチコロン水和剤	シメコナゾール	20	250g×20	90,560	0.125~0.25g	毒		●	●						ソイシアデクライン (日本芝) 800倍 0.2L
パッチバスター	イプロジオン	30	500ml×20	110,000	0.5~3.3ml	毒		●	●		●				紅色雲霧病 (ベントグラス) 250倍 0.5L 125倍 0.25L 雲霧小粒菌核病 (ベントグラス) 125倍 0.25L 300倍 1L
パナーマックス濃剤	プロピコナゾール	14.3	500ml×10	50,000	0.25~0.5ml	非該当		●	●						さび病 (日本芝) 200倍 0.05L 400倍 0.1L 紅色雲霧病 (ベントグラス) 1500倍 0.5L
ブルーデンス水和剤	イプロジオン	17	500g×20	69,020	2.0g	毒		●	●						葉の足跡 (日本芝) 500倍
	ホセチル	40													イエローパッチ (ベントグラス) 500倍 1L
ヘリテージ顆粒水和剤	アノキストロピン	50	250g×4	54,000	0.05~0.17g	非該当		●	●						ソイシアデクライン (日本芝) 3000~4000倍 0.5L 紅色雲霧病 (ベントグラス) 3000~4000倍 0.5L
ペンコシャイン水和剤	オキスボコナゾールフマル酸塩	2.5	1kg×10	39,000	3g	毒			●						葉腐 3g 水量 0.5L
ポリオキシソZDF	ポリオキシソD亜鉛塩	11.3	500g×8	81,600	0.25~8g	毒	A類相当	●	●						葉の足跡 (日本芝) 1000~2000倍 0.5~1L
マナーJ乳剤	イミベンコナゾール	5	1L×10	60,200	0.13~1ml	毒	B類相当	●	●						さび病 (日本芝) 1000~1500倍 0.2L
メダリオン水和剤	フルジオキシニル	50	400g×5	52,000	0.2~0.6g	非該当		●	●						デットスポット病 (ベントグラス) 1250~2500倍 0.5L 紅色雲霧病 (ベントグラス) 833~1250倍 0.5L
モノクタンシフロアブル	イミノクタンシ酢酸塩	5	1L×10	74,900	0.25~3.35ml	毒	B類相当	●	●		●		ブルー		紅色雲霧病 (ベントグラス) 125倍 0.25L 250倍 0.5L (ブルーグラス) 125倍 0.25L 雲霧小粒菌核病、 (ベントグラス、ブルーグラス) 125倍 0.25L 300倍 1L 葉の足跡 (日本芝) 1000倍 0.25L
ユキスター水和剤	イプロジオン	50	(1kg×5袋) ×2	83,000	1g	毒			●				ブルー		紅色雲霧病 雲霧小粒菌核病 (ベントグラス、ブルー) 200倍 0.2L
ラリー水和剤	マイクロフタニル	10	335g×20	78,000	0.125~0.7g	毒	B類相当	●	●		●		ブルー		さび病 (日本芝) 1500~2000倍 1L
緑化用ベンレート水和剤	ベンミル	50	500g×10	50,000	0.17~1g	毒		●	●	●			ブルー		紅色雲霧病 (ベントグラス、ブルーグラス、ライグラス) 1000倍 0.5L
ロブド-水和剤	イプロジオン	16.5	1kg×10	58,200	2~3.3g	毒		●	●		●				雲霧小粒菌核病 (ベントグラス) 300倍 1L
	有機銅	34													